UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Cerese di Virgilio, 25 ottobre 2011

SCELTE GESTIONALI NEL CONTROLLO DELLA STREPTOCOCCOSI SUINA

Vittorio Sala

Dipartimento di Patologia Animale
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria
Sezione di Malattie Infettive

STREPTOCOCCO, SUINO E MENINGITE

Se n'è parlato tanto Spesso a sproposito

Cosa si può dire, ancora ???

VI ASPETTATE RICETTE MAGICHE

O COSE "PRATICAMENTE" UTILI ???

◀◀ SUISIDE DISEASES ▶▶

- *Streptococcus suis*
- *Actinobacillus suis*
- *Haemophilus parasuis*

Cognome..... Streptococcus
Nome..... Suis
nato il..... 1966 (Italia 1984)
(atto n..... P..... S.....)
a..... (.....)
Cittadinanza..... del mondo (suinicolo)
Residenza..... negli allevamenti
Via..... (TUTTI !)
Stato civile..... Liberamente circolante
Professione..... Batterio Patogeno

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....
Capelli.....
Occhi.....
Segni particolari..... Spesso resistente
ai trattamenti
..... Poco resistente nell'ambiente

Firma del titolare.....

IL

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

V. SALA — A. SOCCI — G. REDAELLI
con la collaborazione tecnica di C. BERGAMI — R. PICCININI — C. PAGANI

Sull'isolamento di «Streptococcus suis (tipo 2)» in corso di alcune forme patologiche del suino

Isolation of “Streptococcus suis type II” from swine infections

Key words: *swine pathology, streptococcosis, Streptococcus suis II*

1984

Proceedings of the 14th IPVS Congress, Bologna, Italy, 7-10 July 1996

DISTRIBUTION OF CAPSULAR TYPES AND HEMOLYSIN PRODUCTION OF STREPTOCOCCUS SUIS ISOLATES IN NORTHERN ITALY

V. Sala^{*1}, M. Antonini¹, O. Vischi¹, A. Ansuini², P.F. Guadagnini², G. Conedera³, M. Fabbi², S. Perini²

¹ *Istituto di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria, Università di Milano;* ² *Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, Italy;* ³ *Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie, Italy*

Proceedings of the 14th IPVS Congress, Bologna, Italy, 7-10 July 1996

MORPHOLOGICAL AND BACTERIOLOGICAL STUDY ON SYNOVIAL MEMBRANE IN STREPTOCOCCUS SUIS INFECTION.

L. Della Salda^{*1}, P. Borghetti², V. Sala³, P. Martelli⁴, P.S. Marcato¹

¹ *Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, Università di Bologna;* ² *Ist. Anat. Pat. Vet., Università di Parma;*

³ *Ist. Mal. Inf. Vet., Università di Milano;* ⁴ *Ist. Clinica Medica Veterinaria, Università di Parma, Italy*

DOVE STA IN AZIENDA ?

nelle tonsille e nella
vagina delle scrofe

nelle tonsille degli svezzati

nei suinetti con artrite e
meningite in sala parto e
nello svezzamento

la scrofaia è il serbatoio
dell'infezione

i suinetti si contaminano durante e
dopo il parto

lo svezzamento amplifica
l'infezione

una scrofetta infetta sarà
portatrice /eliminatrice

tuttavia..... l'animale che si contagia
da adulto non rimane portatore

la scrofa trasmette:

con la saliva

con le urine (solo subito dopo il parto)

con l'aria espirata

lo svezzato trasmette:

con la saliva

con i morsi

con l'aria espirata

Cosa si vede

Sala parto:
setticemia – polisierosite
artrite tarsica

Magronaggio – Ingrasso:
brucopolmonite
endocardite valvolare cronica

Svezzamento:
artrite tarsica
meningite acuta

Ciclo:
ritardo di crescita

ARTRITE

MENINGITE

Gli errori manageriali lo favoriscono

- gestione errata del pareggiamento delle nidiate
- taglio dei denti
- eccesso di primipare nelle sale parto
- e loro figli nelle svezzate
- acquisto di rimonte con antibiotico-resistenza

Pareggiamento delle figliate

Privo di rischi solo prima
dell'assunzione del colostro
(parti contemporanei)

I figli delle primipare
diffondono più
probabilmente l'infezione

Da 4-6 ore dopo la nascita, il
rischio d'infezione e scarsa
protezione aumenta
progressivamente

La protezione colostrale
delle primipare è di
minore qualità

E IL RUOLO DEI VIRUS IMMUNODEPRESSORI?

PCV2

PRRSV

- ✿ *Streptococcus suis* è stato il primo batterio per cui è stata dimostrata l'azione favorente della **PRRS**.
- ✿ La meningite è una delle complicanze più frequenti nei focolai di **PMWS**.

Misure preventive efficaci

- rimonte indenni (sì..., ma dove???)
- quarantena (valutazione delle antibiotico-sensibilità dei ceppi presenti)
- pareggiamento solo tra primipare
- gruppi di svezzamento di figli di primipare
- medicazione strategica «intelligente»

MEDICAZIONE STRATEGICA (4 regole ...)

Valutazione dell'effettivo
impatto della malattia
e dei suoi costi
(budget d'intervento)

Identificare la fase clinica
prevalente e posizionare
la medicazione nelle
2 settimane precedenti

Medicazioni «protratte» non
servono e «costano».
Se la medicazione «non va»,
chiedersi perché.

Amoxicillina è ancora
l'antibiotico di prima scelta.
Qualità del prodotto (protetto!)

Grazie per l'attenzione

dipav

www.dipav.unimi.it / vittorio.sala@unimi.it